

**Изучение радиопротекторных свойств белка Damage suppressor  
(Dsup) на модельном объекте *D. melanogaster* и культуре клеток  
человека НЕК293**

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОЕКТА – Dsup

начат 01.01.2021

## Тихоходки (Tardigrada)



Обнаружены во всех биомах от Арктики до Антарктики, на вершинах гор, в глубоководных источниках и холодных грязевых источниках на западе Гренландии.



Тихоходки имеют хорошо развитую нервную систему, в которой выделяется мозг, мышечную, пищеварительную и др. системы, состоящие из дифференцированных тканей.

<https://gifycat.com/fr/energeticcontentrichredandwhitesetter>

## **Экстремотолерантные свойства тихоходок :**

- **Высыхание:** выживает при полном и быстром высыхании до 10 лет (Ангидробиоз)
- **Токсические среды:** устойчивость к растворами, содержащим органические растворители и тяжелые металлы (Cu)
  - **Окислительный стресс:** перекиси ( $H_2O_2$ )
  -
- **Перепады давления:** высокое (7.5 ГПа 12 часов) и вакуум
- **Перепады температур:** от 90°C до -196°C, например, более 1 часа при 82.7°C, более 24 часов при 63.1°C и полная заморозка (Криобиоз)
- **Механическое воздействие:** ударный шок при выстреле со скоростью 0.9 км/с с давлением 1.14 ГПа

*Tardigrada* относятся к группе наиболее устойчивых к радиации животных на Земле, способных выживать после воздействия как редко- так и плотно ионизирующего излучения

### Устойчивость к $\gamma$ -излучению для некоторых видов организмов

Организм	LD <sub>50</sub> или другие имеющиеся данные	Автор
<b>Homo sapiens</b>	LD <sub>50/30d</sub> = 2.5–4.5 Gy	Bolus (2001)
<b>Мышь</b>	LD <sub>50/30d</sub> = 4.5 Gy	Bolus (2001)
<b>Золотая рыбка</b>	LD <sub>50/30d</sub> = 8 Gy	Bolus (2001)
<b>Таракан</b>	LD <sub>50/30d</sub> = 50 Gy	Bolus (2001)
<b>Drosophila melanogaster (Insecta)</b>	LD <sub>50/3</sub> = 1238–1339 Gy	Parashar et al. (2008)
<b>Deinococcus radiodurans (Bacteria)</b>	LD <sub>50</sub> = 10000 Gy	Makarova et al. (2001)
<b>Коловратки</b>	Нет влияния на выживаемость вплоть до 1120 Gy	Gladyshev and Meselson (2008)
<b>Tardigrades</b>	LD <sub>50</sub> = 1270–5000 Gy	Hashimoto and Kunieda (2017)


## Тихоходки - модельный организм для изучения влияния космических условий на живые организмы

### FOTON-M3 mission

TARDIS (Jönsson et al., 2008), RoTaRad (Persson et al., 2011), TARSE (Rebecchi et al., 2011, 2009)

TARDIS (Tardigrades in Space) тихоходки 10 дней находились в условиях космического вакуума ( $10^{-6}$  Pa), воздействия космической радиации (100 мГр) и УФ-излучения.

Воздействие вакуума и космической радиации не оказали на выживаемость существенного влияния (Jönsson et al., 2016, 2008).



<http://teamtardigrades.blogspot.com/>

**Current Biology**




Correspondence

Tardigrades survive exposure to space in low Earth orbit

K. Ingemar Jönsson <sup>1</sup> Elke Rabbow <sup>2</sup>, Ralph O. Schill <sup>3</sup>, Mats Harms-Ringdahl <sup>4</sup>, Petra Rettberg <sup>2</sup>

## Experiments to estimate the impact of ionizing radiation on the survival rate of tardigrades




A high level of radioresistance with  $LD_{50} = 4\text{-}10 \text{ kGy}$ , depending on the type of radiation and the type of tardigrades involved in the experiment  
Actively dividing embryos -  $LD_{50} = 509 \text{ Gy}$  in an experiment using  $\alpha$ -particles  
(Horikawa et al., 2012)

Special protective mechanisms?

## Молекулярные механизмы радиорезистентности тихоходок

В 2016 году секвенирован геном *Ramazzottius varieornatus* – одного из самых радиорезистентных видов тихоходок (Hashimoto et al., 2016)


После анализа данных и сравнения белков *R. varieornatus* со всеми уже известными белками других организмов был обнаружен уникальный белок - Damage suppressor (Dsup), присутствующий только у тихоходок.



Моделирование с помощью I-TASSER


Hashimoto, T., Horikawa, D., Saito, Y. et al. Extremotolerant tardigrade genome and improved radiotolerance of human cultured cells by tardigrade-unique protein. *Nat Commun* 7, 12808 (2016).

a



Dsup колокализуется с ядерной ДНК, т.е. работает в ядре

DLNP JINR Sector of Molecular Genetics of the Cell



**a**

Dsup снижает фрагментацию ДНК в культуре человеческих клеток после воздействия радиации


Hashimoto, T., Horikawa, D., Saito, Y. et al. Extremotolerant tardigrade genome and improved radiotolerance of human cultured cells by tardigrade-unique protein. *Nat Commun* 7, 12808 (2016).


Dsup повышает выживаемость в культуре клеток человека после облучения рентгеновскими лучами

**b**




The tardigrade damage suppressor protein binds to nucleosomes and protects DNA from hydroxyl radicals. Elife. 2019. Chavez C, Cruz-Becerra G, Fei J, Kassavetis GA, Kadonaga JT.







Растения табака, экспрессирующие Dsup, росли лучше контрольных растений на средах, содержащих мутаген этилметан сульфонат (EMS), также после облучения УФ и рентгеновскими лучами.




Kirke, J., Jin, XL. & Zhang, XH. Expression of a Tardigrade Dsup Gene Enhances Genome Protection in Plants. Mol Biotechnol 62, 563–571 (2020). <https://doi.org/10.1007/s12033-020-00273-9>




# DNA Protection by Dsup Protein from Radiation Damage



- Главными целями наших исследований являются изучение механизмов действия белка Dsup и оценка перспектив его использования для повышения радиорезистентности многоклеточных сложных организмов.



Tardigrades exhibit robust interlimb coordination across walking speeds and terrains Jasmine A. Nirody et al. PNAS 2021



Credit: Neves et al. 2020

# Why is *Drosophila melanogaster* a very common animal model used in genetics studies?



The fruit fly *Drosophila melanogaster* is currently the conceptually best understood animal organism

- Cheap and easy to cultivate in the laboratory
- Contains only 4 chromosomes
- A multicellular organism suitable for simulating many human diseases (Drosophila genome is 60% homologous to that of humans, less redundant, and about 75% of the genes responsible for human diseases have homologs in flies)
- brief generation time (12-14 days), lots of offspring
- availability of powerful genetic tools

An ideal organism for the study of development processes, behavior, neurobiology, genetic diseases and effect of many environmental conditions




Image Source: J. Craig Venter Institute

## NOBEL PRIZE AWARDS FOR FRUIT FLY RESEARCHES:


- 1933: Thomas Hunt Morgan – The role played by chromosomes in heredity
- 1946: Hermann Joseph Muller – The production of mutations by means of X-ray irradiation
- 1995: Edward B. Lewis, Christiane Nüsslein-Volhard, Eric F. Wieschaus – The genetic control of early embryonic development
- 2004 : Richard Axel – Odour receptors and the organization of the olfactory system (mainly rodent work)
- 2011: Jules A. Hoffmann – The activation of innate immunity
- 2017: Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash, Michael W. Young – molecular mechanisms controlling the circadian rhythm

# Cell culture model system



## BASE ADVANTAGES

- Closest to human model
- No death for research purposes
- Wide range of cultivation conditions can be controlled
- Short-generation period




## INTERESTING FACTS

- The first successfully cultured cells were Frog nerve fibers
- Polio vaccine was developed through cell culture technique
- First Nobel Prize in cell culture discoveries was awarded to John Franklin Enders, Thomas Huckle Weller, and Frederick Chapman Robbins, who discovered a method of growing the viruses in monkey kidney cell cultures


Pictures from: <https://biomolecula.ru/articles/metody-v-kartinkakh-kletochnye-tehnologii>  
<https://issuu.com/gabrielprieto3/docs/cellculturebasicseu>

## Optimization and synthesis of DNA sequence encoding a Dsup protein


pAL2-Dsup





The source of the Dsup protein is the 1338 bp DNA sequence encoding the Dsup protein (LC050827.1), that was optimized for the *D. melanogaster* genome for a stable high level of synthesis of this protein.




DLNP JINR Sector of Molecular Genetics of the Cell








For the gene instructions to be carried out DNA must be transcribed into RNA. A transcriptome is a collection of all the RNA present in cells, which reflects the current state of all processes occurring in the organism




Transcriptome analysis of Dsup expressing and control Drosophila lines demonstrated effect of Dsup protein on expression of genes involved in chromatin organization, regulation of transcription and neural system functioning


BP GO Identifier	BP GO term	Number of genes	P-value
GO:0006334	nucleosome assembly	42	<0,001
GO:0016321	female meiosis chromosome segregation	24	<0,001
GO:0006352	DNA-templated transcription, initiation	19	<0,001
GO:0006333	chromatin assembly or disassembly	19	<0,001
GO:0051298	centrosome duplication	21	<0,001
GO:0050808	synapse organization	13	<0,001
GO:0002121	inter-male aggressive behavior	10	0,001
GO:0048065	male courtship behavior, veined wing extension	3	0,006
GO:0006355	regulation of transcription, DNA-templated	31	0,007
GO:0042067	establishment of ommatidial planar polarity	6	0,011
GO:0007411	axon guidance	17	0,012
GO:0007601	visual perception	8	0,014
GO:0007218	neuropeptide signaling pathway	8	0,017
GO:0035023	regulation of Rho protein signal transduction	4	0,020
GO:0035317	imaginal disc-derived wing hair organization	5	0,023
GO:0019722	calcium-mediated signaling	4	0,025
GO:0007367	segment polarity determination	6	0,027
GO:0006351	transcription, DNA-templated	27	0,027
GO:0007042	lysosomal lumen acidification	3	0,028
GO:0007186	G-protein coupled receptor signaling pathway	13	0,034
GO:0001738	morphogenesis of a polarized epithelium	4	0,035
GO:0007464	R3/R4 cell fate commitment	4	0,035
GO:0007157	heterophilic cell-cell adhesion via plasma membrane cell adhesion molecules	5	0,043
GO:0016318	ommatidial rotation	5	0,043
GO:0007476	imaginal disc-derived wing morphogenesis	17	0,045
GO:0045197	establishment or maintenance of epithelial cell apical/basal polarity	4	0,048

## Сеть биологических процессов, на которые оказал влияние белок Dsup






2014 Thinkstock




Может применяться:

- для временного повышения радиорезистентности
  - для защиты окружающих опухоль тканей при радиотерапии
    - для pilotируемой космонавтики
  - в качестве ДНК-протектора при длительной криоконсервации биологических материалов




Length:445  
Mass (Da):42,848

10 20 30 40 50  
MASTHQSSTE PSSTGKSEET KKDASQGSGQ DSKNVTVTKG TGSSATSAAI  
60 70 80 90 100  
VKTGGSQGKD SSTTAGSSST QGQKFSTTPT DPKTFSSDQK EKSKEPAKEV  
110 120 130 140 150  
PSGGDSKSQG DTKSQSDAKS SGQSQGQSKD SGKSSSDSSK SHSVIGAVKD  
160 170 180 190 200  
VVAGAKDVAG KAVEDAPSIM HTAVDAVKNA ATTVKDVASS AASTVAEKVV  
210 220 230 240 250  
DAYHSVVGDK TDDKKEGEHS GDKKDDSKAG SGSGQGGDNK KSEGETSGQA  
260 270 280 290 300  
ESSSGNEGAA PAKGRGRGRP PAAAKGVAKG AAKGAAASKG AKSGAESSKG  
310 320 330 340 350  
GEQSSGDIEM ADASSKGGSQD QRDSAATVGE GGASGSEGGA KKGRGRGAGK  
360 370 380 390 400  
KADAGDTSAE PPRRSSRLTS SGTGAGSAPA AAKGGAKRAA SSSSTPSNAK  
410 420 430 440  
KQATGGAGKA AATKATAAKS AASKAPQNGA GAKKKGGKAG GRKRK




Recombination vector

Recombinant *E. coli*




Expression



Protein purification

SAXS (ЛНФ ОИЯИ, МФТИ, ESRF Гренобль, Франция), SANS (ЛНФ ОИЯИ) и DLS (ЛНФ ОИЯИ).



Model of Dsup structure derived from experimental data (DAMMIF package)

## Определение вторичной структуры белка Dsup с помощью методов SAXS, DLS и кругового дихроизма

Dsup не относится к глобулярным белкам и для него возможно присутствие вторичной структуры. Для уточнения вторичной структуры белка Dsup необходимо провести измерения с помощью методов кругового дихроизма, DLS и SAXS в нативных и денатурирующих условиях. Эксперименты будут проведены в 2023 году с использованием оборудования ЛНФ ОИЯИ и МФТИ.



**SAXS Xeuss 3.0, LNP JINR**

Оценка в клетках культуры человека HEK293, экспрессирующих Dsup, метаболической активности (МТТ-тест) и индукции апоптоза (по активности каспазы 3), определение уровня активных форм кислорода в клетках.

МТТ тест - измерение активности NAD(P)H-dependent oxidoreductase, которые являются индикатором митохондриального дыхания и косвенно служат для оценки клеточной энергетической емкости клетки, жизнеспособности клеток и их пролиферативной способности.

Каспазы – протеолитические ферменты, присутствующие в клетке в виде предшественников - важные участники процесса апоптоза (запограммированной клеточной гибели).